

ANNEXE 1

CHECK-LIST A DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX

- Conditions de conservation et de transport des vaccins :
 - Respecter les contraintes de stockage et de transport des vaccins conformément au résumé des caractéristiques du produit (RCP).
 - Rappel des caractéristiques du produit :

| Températures | Flacon | Modalités | PFIZER (ARNm) 6/7 doses COMIRNATY® |
|----------------------------------|--|-----------------------|--|
| -90°C / -60°C | Non ouvert | Stockage et transport | 6 mois |
| -25°C / -15°C | Non ouvert | Stockage et transport | 2 semaines* |
| +2°C à +8°C | Non ouvert | Stockage | 1 mois |
| | | Transport | 12 heures |
| +2°C à +8°C | Ouvert | Stockage | 6 heures |
| | | Stockage / Transport | 2 heures [9°C – 30°C] |
| | Non ouvert | Stockage | 6 heures [9°C – 30°C] |
| | | Transport | 6 heures flacons ou seringues (<30°C) |
| Gammes de températures ambiantes | Ouvert = reconstitué pour Pfizer | Stockage | 6 heures [9°C – 30°C] |
| | | Transport | 6 heures flacons ou seringues (<30°C) |

*Pfizer : ensuite les flacons peuvent être replacés à -90°C / -60°C – une seule fois.

- Pour le transport (e.g. sacoche isotherme ou glacière électrique),
- Pour le stockage (e.g. réfrigérateur).

Contraintes communes : transport des flacons stables, sans secousses, ne pas congeler. Ne pas exposer à la lumière extérieure ou aux ultraviolets.